


Pautas de Fototerapia para RN Término y Pretérmino.

Maternitat Hosp.
Sant Joan de Déu.
Barcelona

Nota: para RNT usar tablas recomendadas por la A.A.P en > de 35 sem



Retirada de la FT > 72h de vida	Indicación de ET (2)
15	según curva
12	FT+5 ⁽³⁾
10	FT+4
9	FT+3
(mg/dL)	(mg/dL)

Se iniciará FT cuando los valores de bilirrubina se sitúen por encima de la línea correspondiente a la edad gestacional y peso de nacimiento. En los RN prematuros (<=36 semanas), en caso de conflicto entre EG y PN, siempre prevalecerá la EG.

Si hay patología: hemólisis, Apgar 5 min. <6, sufrimiento cerebral, meningitis, pH <7,15 más de 1 hora, pO2 <40 mmHg más de 1 hora, T. axilar <35°C más de 1 hora, proteínas totales <45 g/L (<40 g/L en el prematuro), sumar 2 puntos a la bilirrubina total obtenida.

(1) Indicación de ET para >= 2500g de PN y >= 37 semanas de EG (excluidas formas hemolíticas).

(2) En ictericias hemolíticas ver indicaciones específicas de ET en la pauta correspondiente.

(3) FT+5 significa que debe practicarse la ET si la bilirrubina total es superior en 5 puntos a los valores de indicación de FT (excluidas formas hemolíticas).