

El parto vaginal de nalgas en el muy bajo peso al nacer (MBPN): experiencia de un centro neonatal.

Stohl HE, Szymanski LM, Althaus J;

Department of Gynecology and Obstetrics, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21287-1228, USA. *Journal of Perinatal Medicine* (Mayo 2011;Vol 39(4):379 83

Resumen de Objetivos: Comparar los resultados materno y neonatal a corto plazo de recién nacidos de muy bajo peso (MBPN) en posición de nalgas según el tipo de parto.

Material y métodos: Todos los fetos ubicados en posición de nalgas nacidos de 24-0/7 a 26-6/7 semanas de gestación en nuestra institución entre 2000 y 2008 fueron elegibles para el estudio. Resumieron los datos de registros médicos incluidos demografía materna, datos del parto y resultados neonatales.

Resultados: Hubo 26 partos por vía vaginal y 39 por cesárea. La edad materna no difirió entre los grupos; la edad gestacional fue mayor en el grupo de cesárea en cinco días. A corto plazo los resultados neonatales no difirieron entre los grupos. De los 39 partos por cesárea, 27 fueron con incisiones uterinas clásicas. La pérdida estimada de sangre (732 ml vs 362 ml) y la tasa de infección después del parto (26% vs 4%) fueron mayores en partos por cesárea.

Conclusión: el resultado neonatal no ha mejorado en los niños de MBPN con posición en nalgas nacidos por cesárea. Teniendo en cuenta la morbilidad de la cesárea clásica, el parto vaginal de bajo peso al nacer del bebé en posición de nalgas puede ser considerada segura.

Full Text: solicitarlo en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21627491>